Extremereignisse im Klimawandel – Vergangenheit und Zukunft

Klimasystem und Klimafolgen

Klaus Haslinger

klaus.haslinger@geosphere.at

KLIMA AKTUELL
GeoSphere Austria
KLIMAMONITORING

Zeitraum < Winter > < 2025 > Messstation < Österreichweit >

LUFTEMPERATUR NIEDERSCHLAG SONNENSCHIN BERICHTE

Klima aktuell – Winter 2024/2025

Station Wien-Hohe Warte
Tagesmittelwerte der Lufttemperatur für Winter 2025

Mittelwert Winter 2025	Mittelwert Winter 1961-1990
2,7 °C	0,8 °C

Station Wien-Hohe Warte
Aufsummierte Tagessummen des Niederschlags für Winter 2025

Summe Winter 2025	Summe Winter 1961-1990
37 mm	122 mm

Klimawandel in Österreich – Lufttemperatur

1961-1990	1991-2020
5,8 °C	7,0 °C
+1,2 °C

Klimawandel in Österreich – Jahresniederschlagssumme

1961-1990

1991-2020

1067 mm

1103 mm

+36 mm

1961-1990	1991-2020
1537 h	1670 h
+133 h

Änderung von Klimaindikatoren am Beispiel Wien Hohe Warte

Anzahl der Frosttage (Tiefsttemperatur < 0°C) in Wien Hohe Warte

→ Warme Extreme zeigen stärkere Veränderung als Kalte Extreme

Anzahl der heißen Tage (Höchsttemperatur > 30°C) in Wien Hohe Warte

Tagesniederschlagssummen: Häufigkeit und Menge

1961-1990	1991-2020
44 mm	47 mm
+3 mm = +6,5 %

Schwache bis Moderate
Tagesniederschlagssummen

Beträchtliche bis Extreme
Tagesniederschlagssummen

Klimawandel in Österreich – Extremniederschläge (> 99%)

Stundenniederschlagssummen:

1961-1990	1991-2020
8,9 mm	10,2 mm
+1,3 mm = +15 %(!)

Stundenniederschlagssummen:

„Die Clausius-Clapeyron-Gleichung besagt, dass die spezifische Luftfeuchtigkeit in niedrigen Höhenlagen um etwa 7 % pro °C der Erwärmung zunimmt, wenn man davon ausgeht, dass die relative Luftfeuchtigkeit konstant bleibt.“

Entwicklung einer neuen Methode zur Erfassung von Tagen mit Potenzial für konvektiven Starkregen

→ Verschneidung von Feuerwehr-Einsatzdaten und Atmosphärischen Daten zur Gewitterbildung

Intensitätsstufe	Bezeichnung	Interpretation für die Allgemeinheit und für Einsatzkräfte
Gelb	Markantes Wetter	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Anpassung des Verhaltens ist bei Aktivitäten im Freien nötig. • Aktivitäten von Feuerwehren umfassen meist vorbeugende Arbeiten und Kontrolltätigkeit. Akute Einsätze betreffen nur wenige neuralgische Punkte.
Orange	Unwetter	<ul style="list-style-type: none"> • Schäden treten auf. • Die lokal zuständigen Feuerwehr hat die Situation alleine unter Kontrolle und kann die Einsätze innerhalb von weniger als 24 Stunden bewältigen.
Rot	Extremes Unwetter	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Katastrophen-Situation tritt ein. • Einsätze dauern länger als 24 Stunden. Die lokal zuständige Feuerwehr erhält Katastrophenhilfe auf Bezirks- oder Landesebene.

Änderung der Anzahl der Tage mit Unwetterpotenzial der Warnstufe Orange

Änderung der Anzahl der Tage mit Unwetterpotenzial der Warnstufe Rot

Klimawandel in Österreich – potenzielle Verdunstung

1961-1990

1991-2020

482 mm

557 mm

+ 75 mm

Ein Indikator für den Bodenwasserhaushalt – **die klimatische Wasserbilanz:**

Potenzielle Verdunstung

- Temperatur
- Sonnenschein
- Wind

Niederschlag (+Schneesmelze)

Klimatische Wasserbilanz = Niederschlag – pot. Verdunstung

Trockene Bedingungen

Feuchte Bedingungen

Maxwell u.
Condon 2016

Änderung der Wasserbilanzgrößen

Dürredekaden

1860er Jahre: Letzte Vollständige Austrocknung des Neusiedler Sees

1940er Jahre: Extremes Niederwasser an der Donau

2010er Jahre (?): Rezente Dürrephase

- Langfristig zunehmender Trend der Verdunstung
- Gründe: Höhere Temperaturen, mehr Sonnenschein, längere Vegetationsperiode

Wie wird sich das Klima in Zukunft entwickeln?

Sozioökonomische Entwicklung:
Globalisierung oder Regionalisierung?
Bevölkerungswachstum?
Anpassung und/oder Mitigation?

- Klimamodelle berechnen atmosphärische Prozesse auf einer 3-dimensionalen Matrix
- Gitterweite derzeit: 200-100km, in Einzelfällen bis 25km; durch stetig steigende Computerleistung kontinuierliche Verringerung der Auflösung
- Gekoppelt mit Ozean-, Biosphären-, und Eisschildmodellen

Neelin 2011

McCuffie und Henderson-Sellers 2005

Globale Klimawandelszenarien (IPCC 2021)

„Pariser Abkommen“

+1.5°C

Temperatur

Niederschlag

„Moderater Klimaschutz“

+3.0°C

Carbon dioxide (GtCO₂/yr)

a) Global surface temperature change relative to 1850-1900

Klimaszenarien für Österreich – Temperaturentwicklung

Moderater Klimaschutz

„Worst Case“

Alle Daten und Informationen sind unter data.ccca.ac.at/climamap frei verfügbar!

Klimaszenarien für Österreich – potenzielle Verdunstung

Jahressumme der potenziellen Verdunstung

Niederschlagsänderung, „Worst Case“ Szenario

Geringe Modell-
übereinstimmung

Simulierte
Niederschlagsänderung [%]

Keine signifikante
Änderung

Schwankungsbreite [%]

+10,9

-11,7

2071-2100 Winter | RCP8.5

Ø +25,6% für das gesamte Bundesland

Schwankungsbreite [%]

+17,7

-17,0

2071-2100 Sommer | RCP8.5

Ø +1,9% für das gesamte Bundesland

Moderater Klimaschutz

„Worst Case“

Alle Daten und Informationen sind unter data.ccca.ac.at/climamap frei verfügbar!

- Kleinräumige Unwetter (Gewitter, Hagel, Sturmböen)

Szenario RCP8.5 (ungebremster Emissionsanstieg - „worst case“)

In Zukunft wird die Anzahl an Tagen mit Unwetterpotenzial durch konvektive Ereignisse (Gewitter, Hagel, Sturmböen) mit hoher Wahrscheinlichkeit zunehmen.

- Extremniederschläge - Jährlichkeiten

Auswertung der ÖKS15 Klimaszenarien

Änderung der mittleren klimatischen Wasserbilanz als Indikator für die Bodenfeuchte

- Im Jahresmittel positives Änderungssignal der klimatischen Wasserbilanz → feuchtere Bedingungen

Änderungen in der Häufigkeit extremer Dürreereignisse

Jährlichkeit für ein 50-jähriges Ereignis sinkt auf 30-20 Jahre

→ Ereignisse dieser Stärke werden häufiger

Das Risiko für Dürre nimmt in Zukunft zu – warum?

Das Klima in Mitteleuropa wird mit Fortschreiten des Klimawandels „variabler“

Temperatur:

Weiterer Anstieg, Zunahme an Hitzetagen, Verlängerung der Vegetationsperiode

Jahresniederschlag:

Wenig Änderung, eher leichte Zunahme

Starkniederschlag :

Weitere Zunahme, physikalischer Zusammenhang mit Lufttemperatur

Verdunstung:

Weitere Zunahme, bedingt durch Temperaturanstieg, Verlängerung der Vegetationsperiode

Generell gilt:

**Das (Niederschlags)Klima wird zunehmend „variabler“,
Ausreißer nach oben und unten werden größer!**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Klimasystem und Klimafolgen

Klaus Haslinger

klaus.haslinger@geosphere.at